PCC175 - TÉCNICAS DE OTIMIZAÇÃO MULTI-OBJETIVO

AULAS 07 E 08 - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE MOEA'S

Gladston Juliano Prates Moreira
email: gladston@ufop.edu.br

CSILab, Departamento de Computação
Universidade Federal de Ouro Preto

3 de dezembro de 2024

Introdução

Medidas de Avaliação de Desempenho

- ▶ MOEAs (Primeira geração)
 - ▶ MOGA (Fonseca & Fleming 1993);
 - ▶ NPGA (Horn et al. 1994);
 - ▶ NSGA (Srinivas & Deb 1994).
- ▶ MOEAs (Secunda geração)
 - ▶ SPEA (Zitzler & Thiele 1999);
 - ▶ PAES (Knowles & Corne 1999);
 - ▶ SPEA-II (Zitzler et al. 2001);
 - ▶ NSGA-II (Deb et al. 2002).

Aproximações à Fronteira Pareto global.

Quando é possível dizer que um conjunto de estimativas Pareto-ótimas provenientes de um determinado algoritmo é melhor que algum outro conjunto de estimativas provenientes de outro algoritmo?

Um conjunto de soluções de alta qualidade deve:

- ▶ a proximidade em relação ao Pareto-ótimo real (convergência);
- ▶ diversidade em termos da distribuição e do espalhamento ao longo da fronteira Pareto encontrada (uniformidade e cobertura).

Introdução

Como avaliar a qualidade da Fronteira estimada?

- ▶ Se um algoritmo é melhor que o outro, podemos expressar o quão melhor é?
- ▶ Se um algoritmo não pode ser dito ser melhor que o outro, existem alguns aspectos, em que podemos dizer que o primeiro é melhor do que o último?

Introdução

Introdução

Medidas de Avaliação de Desempenho

- ▶ Classificação:
 - ▶ medem o progresso em direção à Fronteira Pareto;
 - ▶ medem a diversidade entre as soluções obtidas;
 - ▶ medem os dois critérios acima.
- ▶ Características:
 - ▶ algumas necessitam do conhecimento do conjunto de Pareto real;
 - ▶ outras sintetizam a qualidade do conjunto de soluções não-dominadas sem a necessidade de um conjunto de referência;
 - ▶ comparam dois ou mais conjuntos de soluções não-dominadas.

- ▶ Classificação:

- ▶ medem o progresso em direção à Fronteira Pareto;
- ▶ medem a diversidade entre as soluções obtidas;
- ▶ medem os dois critérios acima.

- ▶ Características:

- ▶ algumas necessitam do conhecimento do conjunto de Pareto real;
- ▶ outras sintetizam a qualidade do conjunto de soluções não-dominadas sem a necessidade de um conjunto de referência;
- ▶ comparam dois ou mais conjuntos de soluções não-dominadas.

Medidas de Avaliação de Desempenho:

- ▶ Classificação:

- ▶ medem o progresso em direção à Fronteira Pareto;
- ▶ medem a diversidade entre as soluções obtidas;
- ▶ medem os dois critérios acima.

- ▶ Características:

- ▶ algumas necessitam do conhecimento do conjunto de Pareto real;
- ▶ outras sintetizam a qualidade do conjunto de soluções não-dominadas sem a necessidade de um conjunto de referência;
- ▶ comparam dois ou mais conjuntos de soluções não-dominadas.

- ▶ Classificação:
 - ▶ medem o progresso em direção à Fronteira Pareto;
 - ▶ medem a diversidade entre as soluções obtidas;
 - ▶ medem os dois critérios acima.
- ▶ Características:
 - ▶ algumas necessitam do conhecimento do conjunto de Pareto real;
 - ▶ outras sintetizam a qualidade do conjunto de soluções não-dominadas sem a necessidade de um conjunto de referência;
 - ▶ comparam dois ou mais conjuntos de soluções não-dominadas.

Medidas de Avaliação de Desempenho:

- ▶ Classificação:
 - ▶ medem o progresso em direção à Fronteira Pareto;
 - ▶ medem a diversidade entre as soluções obtidas;
 - ▶ medem os dois critérios acima.
- ▶ Características:
 - ▶ algumas necessitam do conhecimento do conjunto de Pareto real;
 - ▶ outras sintetizam a qualidade do conjunto de soluções não-dominadas sem a necessidade de um conjunto de referência;
 - ▶ comparam dois ou mais conjuntos de soluções não-dominadas.

Medidas de Avaliação de Desempenho:

- ▶ Classificação:
 - ▶ medem o progresso em direção à Fronteira Pareto;
 - ▶ medem a diversidade entre as soluções obtidas;
 - ▶ medem os dois critérios acima.
- ▶ Características:
 - ▶ algumas necessitam do conhecimento do conjunto de Pareto real;
 - ▶ outras sintetizam a qualidade do conjunto de soluções não-dominadas sem a necessidade de um conjunto de referência;
 - ▶ comparam dois ou mais conjuntos de soluções não-dominadas.

Progresso em Direção à Fronteira Pareto

Calcula a proximidade de um conjunto Q , com N elementos, em relação ao conjunto de Pareto real P^*

- ▶ P^* : conjunto finito ou infinito de soluções
- ▶ Boa estimativa para a convergência se o conjunto P^* tiver um número grande de elementos.

Error ratio (ER) - (Veldhuizen 1999)

Conta o número de soluções, em Q , que não estão em P^* .

$$ER = \frac{\sum_{i=1}^{|Q|} e_i}{|Q|},$$

onde $e_i = 0$ se o vetor i está em P^* e $e_i = 1$ caso contrário.

- ▶ $\downarrow ER \Rightarrow \uparrow$ convergência para a Fronteira Pareto;
- ▶ ER é a proporção de pontos em Q não pertencentes à Fronteira Pareto real.
- ▶ conhecimento da Fronteira Pareto real.

Error ratio (ER) - (Veldhuizen 1999)

Conta o número de soluções, em Q , que não estão em P^* .

$$ER = \frac{\sum_{i=1}^{|Q|} e_i}{|Q|},$$

onde $e_i = 0$ se o vetor i está em P^* e $e_i = 1$ caso contrário.

- ▶ $\downarrow ER \Rightarrow \uparrow$ **convergência para a Fronteira Pareto;**
- ▶ ER é a proporção de pontos em Q não pertencentes à Fronteira Pareto real.
- ▶ conhecimento da Fronteira Pareto real.

Error ratio (ER) - (Veldhuizen 1999)

Conta o número de soluções, em Q , que não estão em P^* .

$$ER = \frac{\sum_{i=1}^{|Q|} e_i}{|Q|},$$

onde $e_i = 0$ se o vetor i está em P^* e $e_i = 1$ caso contrário.

- ▶ $\downarrow ER \Rightarrow \uparrow$ **convergência para a Fronteira Pareto;**
- ▶ ER é a proporção de pontos em Q não pertencentes à Fronteira Pareto real.
- ▶ conhecimento da Fronteira Pareto real.

Error ratio (ER) - (Veldhuizen 1999)

Conta o número de soluções, em Q , que não estão em P^* .

$$ER = \frac{\sum_{i=1}^{|Q|} e_i}{|Q|},$$

onde $e_i = 0$ se o vetor i está em P^* e $e_i = 1$ caso contrário.

- ▶ $\downarrow ER \Rightarrow \uparrow$ **convergência para a Fronteira Pareto;**
- ▶ ER é a proporção de pontos em Q não pertencentes à Fronteira Pareto real.
- ▶ conhecimento da Fronteira Pareto real.

Medidas de Avaliação de Desempenho:

$$ER = \frac{3}{5} = 0.6$$

Set Coverage Metric - Zitzler (1999)

Calcula a proporção de soluções, em um conjunto B , que são dominadas pelas soluções de um conjunto A .

$$C(A, B) = \frac{|b \in B \mid \exists a \in A : a \preceq b|}{|B|}$$

- ▶ $C(A, B) = 1 \Rightarrow$ todos os membros de B são dominados por A .
- ▶ $C(A, B) = 0 \Rightarrow$ nenhum membro de B é dominado por A .
- ▶ Se $A = P^*$ e $B = Q$. Assim, $C(P^*, Q)$ determina a proporção de soluções, em Q , que são dominadas pelas soluções de P^* .

Set Coverage Metric - Zitzler (1999)

Calcula a proporção de soluções, em um conjunto B , que são dominadas pelas soluções de um conjunto A .

$$C(A, B) = \frac{|b \in B \mid \exists a \in A : a \preceq b|}{|B|}$$

- ▶ $C(A, B) = 1 \Rightarrow$ **todos os membros de B são dominados por A .**
- ▶ $C(A, B) = 0 \Rightarrow$ **nenhum membro de B é dominado por A .**
- ▶ Se $A = P^*$ e $B = Q$. Assim, $C(P^*, Q)$ determina a proporção de soluções, em Q , que são dominadas pelas soluções de P^* .

Set Coverage Metric - Zitzler (1999)

Calcula a proporção de soluções, em um conjunto B , que são dominadas pelas soluções de um conjunto A .

$$C(A, B) = \frac{|b \in B \mid \exists a \in A : a \preceq b|}{|B|}$$

- ▶ $C(A, B) = 1 \Rightarrow$ **todos os membros de B são dominados por A .**
- ▶ $C(A, B) = 0 \Rightarrow$ **nenhum membro de B é dominado por A .**
- ▶ Se $A = P^*$ e $B = Q$. Assim, $C(P^*, Q)$ determina a proporção de soluções, em Q , que são dominadas pelas soluções de P^* .

Set Coverage Metric - Zitzler (1999)

Calcula a proporção de soluções, em um conjunto B , que são dominadas pelas soluções de um conjunto A .

$$C(A, B) = \frac{|b \in B \mid \exists a \in A : a \preceq b|}{|B|}$$

- ▶ $C(A, B) = 1 \Rightarrow$ **todos os membros de B são dominados por A .**
- ▶ $C(A, B) = 0 \Rightarrow$ **nenhum membro de B é dominado por A .**
- ▶ Se $A = P^*$ e $B = Q$. Assim, $C(P^*, Q)$ determina a proporção de soluções, em Q , que são dominadas pelas soluções de P^* .

Medidas de Avaliação de Desempenho:

$$C(P^*, Q) = \frac{3}{5} = 0.6$$

Generational Distance (GD) - (Nebro et al. 2006)

Calcula a distância média das soluções de Q em relação as soluções de P^* .

$$GD = \frac{\left(\sum_{i=1}^{|Q|} d_i^2\right)^{1/2}}{|Q|},$$

onde d_i é a distância euclidiana (no espaço dos objetivos) entre a solução $i \in Q$ e a solução mais próxima em P^* .

- ▶ necessita de uma normalização nos valores das funções-objetivo.
- ▶ Conhecimento da Fronteira Pareto real.

Generational Distance (GD) - (Nebro et al. 2006)

Calcula a distância média das soluções de Q em relação as soluções de P^* .

$$GD = \frac{\left(\sum_{i=1}^{|Q|} d_i^2\right)^{1/2}}{|Q|},$$

onde d_i é a distância euclidiana (no espaço dos objetivos) entre a solução $i \in Q$ e a solução mais próxima em P^* .

- ▶ necessita de uma normalização nos valores das funções-objetivo.
- ▶ Conhecimento da Fronteira Pareto real.

Generational Distance (GD) - (Nebro et al. 2006)

Calcula a distância média das soluções de Q em relação as soluções de P^* .

$$GD = \frac{\left(\sum_{i=1}^{|Q|} d_i^2\right)^{1/2}}{|Q|},$$

onde d_i é a distância euclidiana (no espaço dos objetivos) entre a solução $i \in Q$ e a solução mais próxima em P^* .

- ▶ necessita de uma normalização nos valores das funções-objetivo.
- ▶ Conhecimento da Fronteira Pareto real.

Medidas de Avaliação de Desempenho:

Medidas de Avaliação de Desempenho:

Solução	f_1	f_2
1	1.0	7.5
2	1.1	5.5
3	2.0	5.0
4	3.0	4.0
5	4.0	2.8
6	5.5	2.5
7	6.8	2.0
8	8.4	1.2

$$d_{A1} = \sqrt{(1.2 - 1.0)^2 + (7.8 - 7.5)^2}$$

$$d_{B3} = \sqrt{(2.8 - 2.0)^2 + (5.1 - 5.0)^2}$$

$$d_{C5} = \sqrt{(4.0 - 4.0)^2 + (2.8 - 2.8)^2}$$

$$d_{D7} = \sqrt{(7.0 - 6.8)^2 + (2.2 - 2.0)^2}$$

$$d_{E8} = \sqrt{(8.4 - 8.4)^2 + (1.2 - 1.2)^2}$$

$$GD = \frac{0.36 + 0.81 + 0 + 0.28 + 0}{5} = 0.19$$

Diversidade entre as Soluções Encontradas

Spacing measure (**S**) - (Schott 1995)

É calculada utilizando a distância relativa entre duas soluções consecutivas pertencentes ao conjunto não-dominado.

$$S = \sqrt{\frac{1}{|Q|} \sum_{i=1}^{|Q|} (d_i - \bar{d})^2},$$

onde $d_i = \min_{j \neq i} \sum_{k=1}^m |f_k^i - f_k^j|$ e $\bar{d}$ a média das distâncias d_i .

- ▶ Se $S = 0$, indica que todas as soluções da Fronteira estimada estão equidistantemente espaçadas.

Spacing measure (**S**) - (Schott 1995)

É calculada utilizando a distância relativa entre duas soluções consecutivas pertencentes ao conjunto não-dominado.

$$S = \sqrt{\frac{1}{|Q|} \sum_{i=1}^{|Q|} (d_i - \bar{d})^2},$$

onde $d_i = \min_{j \neq i} \sum_{k=1}^m |f_k^i - f_k^j|$ e $\bar{d}$ a média das distâncias d_i .

- ▶ Se $S = 0$, indica que todas as soluções da Fronteira estimada estão equidistantemente espaçadas.

Medidas de Avaliação de Desempenho:

Solução	f_1	f_2
1	1.0	7.5
2	1.1	5.5
3	2.0	5.0
4	3.0	4.0
5	4.0	2.8
6	5.5	2.5
7	6.8	2.0
8	8.4	1.2

$$d_A = \min((1.6 + 2.7), (2.8 + 5.0), (5.8 + 5.6), (7.2 + 6.6)) \\ = 4.3$$

$$d_B = 3.5, d_C = 3.5, d_D = 2.4, d_E = 2.4$$

$$\bar{d} = \frac{4.3 + 3.5 + 3.5 + 2.4 + 2.4}{5} = 3.22$$

$$S = \sqrt{\frac{(4.3 - 3.22)^2 + \dots + (2.4 - 3.22)^2}{5}} = 0.73$$

Δ **measure** - (Deb et al. 2002)

$$\Delta = \frac{\sum_{m=1}^M d_m^e + \sum_{i=1}^{|Q|-1} |d_i - \bar{d}|}{\sum_{m=1}^M d_m^e + (|Q| - 1)\bar{d}},$$

onde d_i = é a distância Euclidiana entre duas soluções consecutivas, $\bar{d}$ a média das distâncias d_i e d_m^e a distância entre os pontos extremos de P^* e de Q (m -ésima função-objetivo).

► Se $\downarrow \Delta \Rightarrow$ melhor diversidade.

Δ **measure** - (Deb et al. 2002)

$$\Delta = \frac{\sum_{m=1}^M d_m^e + \sum_{i=1}^{|Q|-1} |d_i - \bar{d}|}{\sum_{m=1}^M d_m^e + (|Q| - 1)\bar{d}},$$

onde d_i = é a distância Euclidiana entre duas soluções consecutivas, $\bar{d}$ a média das distâncias d_i e d_m^e a distância entre os pontos extremos de P^* e de Q (m -ésima função-objetivo).

- ▶ Se $\downarrow \Delta \Rightarrow$ melhor diversidade.

Medidas de Avaliação de Desempenho:

Medidas de Avaliação de Desempenho:

Soluções 8 e E coincidem $\rightarrow d_2^e = 0$
 $d_1^e = 0.4$

Temos também

$$d_1 = 3.1, \quad d_2 = 2.6$$

$$d_3 = 3.1, \quad d_4 = 1.2$$

A média desses valores é $\bar{d} = 2.5$

$$\begin{aligned}\Delta &= \frac{0.4 + 0 + |3.1 - 2.5| + |2.6 - 2.5| + |3.1 - 2.5| + |1.2 - 2.5|}{0.4 + 0.0 + 4 \times 2.5} \\ &= 0.28\end{aligned}$$

Progresso em Direção à Fronteira Pareto e Diversidade entre as Soluções Encontradas

S-Metric (HV) - (Zitzler & Thiele 1999)

Calcula o hiper-volume da região multi-dimensional que o conjunto Q e um ponto de referência englobam $\Rightarrow$ calcula o tamanho da região que Q domina.

Medidas de Avaliação de Desempenho:

S-Metric (HV) - (Zitzler & Thiele 1999)

- ▶ independente de escala;
- ▶ conhecimento de um ponto de referência que pode alterar o valor da medida;
- ▶ alto custo computacional

Medidas de Avaliação de Desempenho:

Medidas de Avaliação de Desempenho:

medidas unárias vs medidas binárias

Exemplos

Medidas de qualidade unárias normalmente não dizem que S domina T ; no máximo que S não domina T .

Exemplos

Medidas de qualidade unárias normalmente não dizem que S domina T ; no máximo que S não domina T .

Exemplos

application of
quality measures

	S	T
hypervolume	432.34	420.13
distance	0.3308	0.4532
diversity	0.3637	0.3463
spread	0.3622	0.3601
cardinality	6	5

A aproximação *S* é “melhor”.

Exemplos

application of
quality measures

	S	T
hypervolume	432.34	420.13
distance	0.3308	0.4532
diversity	0.3637	0.3463
spread	0.3622	0.3601
cardinality	6	5

A aproximação *S* é “melhor”.

Medidas de Avaliação de Desempenho:

- ▶ Em otimização multi-objetivo, o resultado da otimização é um conjunto de soluções - Fronteira Pareto;
- ▶ A avaliação do conjunto de soluções obtidas consiste em dois aspectos: propriedade de convergência e propriedade diversidade;
- ▶ Não existe nenhuma medida de qualidade unária que é capaz de indicar se uma aproximação A é melhor do que uma aproximação B , mesmo quando consideramos uma combinação finita dessas medidas;
- ▶ Existência de várias medidas de desempenho;
- ▶ Uma vez que a avaliação de desempenho de MOEAs representa uma tarefa multicritério, a consideração de medidas binárias de qualidade. é muito útil.

Medidas de Avaliação de Desempenho:

- ▶ Em otimização multi-objetivo, o resultado da otimização é um conjunto de soluções - Fronteira Pareto;
- ▶ A avaliação do conjunto de soluções obtidas consiste em dois aspectos: propriedade de convergência e propriedade diversidade;
- ▶ Não existe nenhuma medida de qualidade unária que é capaz de indicar se uma aproximação A é melhor do que uma aproximação B , mesmo quando consideramos uma combinação finita dessas medidas;
- ▶ Existência de várias medidas de desempenho;
- ▶ Uma vez que a avaliação de desempenho de MOEAs representa uma tarefa multicritério, a consideração de medidas binárias de qualidade. é muito útil.

Medidas de Avaliação de Desempenho:

- ▶ Em otimização multi-objetivo, o resultado da otimização é um conjunto de soluções - Fronteira Pareto;
- ▶ A avaliação do conjunto de soluções obtidas consiste em dois aspectos: propriedade de convergência e propriedade diversidade;
- ▶ Não existe nenhuma medida de qualidade unária que é capaz de indicar se uma aproximação A é melhor do que uma aproximação B , mesmo quando consideramos uma combinação finita dessas medidas;
- ▶ Existência de várias medidas de desempenho;
- ▶ Uma vez que a avaliação de desempenho de MOEAs representa uma tarefa multicritério, a consideração de medidas binárias de qualidade. é muito útil.

Medidas de Avaliação de Desempenho:

- ▶ Em otimização multi-objetivo, o resultado da otimização é um conjunto de soluções - Fronteira Pareto;
- ▶ A avaliação do conjunto de soluções obtidas consiste em dois aspectos: propriedade de convergência e propriedade diversidade;
- ▶ Não existe nenhuma medida de qualidade unária que é capaz de indicar se uma aproximação A é melhor do que uma aproximação B , mesmo quando consideramos uma combinação finita dessas medidas;
- ▶ Existência de várias medidas de desempenho;
- ▶ Uma vez que a avaliação de desempenho de MOEAs representa uma tarefa multicritério, a consideração de medidas binárias de qualidade. é muito útil.

Medidas de Avaliação de Desempenho:

- ▶ Em otimização multi-objetivo, o resultado da otimização é um conjunto de soluções - Fronteira Pareto;
- ▶ A avaliação do conjunto de soluções obtidas consiste em dois aspectos: propriedade de convergência e propriedade diversidade;
- ▶ Não existe nenhuma medida de qualidade unária que é capaz de indicar se uma aproximação A é melhor do que uma aproximação B , mesmo quando consideramos uma combinação finita dessas medidas;
- ▶ Existência de várias medidas de desempenho;
- ▶ Uma vez que a avaliação de desempenho de MOEAs representa uma tarefa multicritério, a consideração de medidas binárias de qualidade. é muito útil.

- ▶ D. Van Veldhuizen & G. Lamont (2000). On Measuring Multiobjective Evolutionary Algorithm Performance, IEEE, pp. 204-211.
- ▶ Joshua Knowles & David Corne (2002). On Metrics for Comparing Nondominated Sets, IEEE, pp. 711-716.
- ▶ Tatsuya Okabe, Yaochu Jin & Bernhard Sendhoff (2003). A Critical Survey of Performance Indices for Multi-Objective Optimisation, IEEE, pp. 878-885.
- ▶ Zhenan He & Gary Yen (2011). An Ensemble Method for Performance Metrics in Multiobjective Evolutionary Algorithms, IEEE, pp. 1724-1729.