# Ajuste de Curvas pelo Método dos Mínimos Quadrados

Marcone Jamilson Freitas Souza, Departamento de Computação, Instituto de Ciências Exatas e Biológicas, Universidade Federal de Ouro Preto, 35400-000 Ouro Preto, MG, Brasil. Homepage: http://www.decom.ufop.br/prof/marcone, E-mail: marcone@iceb.ufop.br

## 1 Introdução

Em muitas situações, conhece-se uma tabela de pontos $(x_i, y_i)$, onde cada $y_i$ é obtido experimentalmente, e deseja-se obter a expressão analítica de uma dada curva $y = f(x)$ que melhor se ajusta a esse conjunto de pontos. Por exemplo, sabe-se que o número $y$ de bactérias, por unidade de volume, existente em uma cultura após um determinado número $x$ de horas, cresce exponencialmente com o aumento de $x$. Neste caso, o número de bactérias cresce com o decorrer das horas na forma $y = \alpha e^{\beta x}$. O problema consiste, então, em determinar os valores mais apropriados dos parâmetros $\alpha$ e $\beta$ desta exponencial.

## 2 Ajuste a uma reta

Mostremos, inicialmente, como ajustar um conjunto de pontos a uma reta $y = a + bx$, onde $a$ e $b$ são parâmetros a serem determinados.

Neste caso, estamos interessados em minimizar a distância de cada ponto $(x_i, y_i)$ da tabela à cada ponto $(x_i,\ a + bx_i)$ da reta, conforme ilustra a figura 1.




Figura 1: Distância de um ponto $(x_i, y_i)$ à reta $y = a + bx$

A distância entre esses pontos é $|y_i - a - bx_i|$ e a soma dos quadrados dessas distâncias é:

$$q = \sum_{i=1}^{n} (y_i - a - bx_i)^2 \tag{2.1}$$

Para determinar o ponto de mínimo da função 2.1, devemos inicialmente anular a derivada parcial de $q$ em relação a cada um de seus parâmetros, isto é:

$$\frac{\partial q}{\partial a} = -2\sum_{i=1}^{n}(y_i - a - bx_i) = 0 \tag{2.2}$$

$$\frac{\partial q}{\partial b} = -2\sum_{i=1}^{n} x_i(y_i - a - bx_i) = 0 \tag{2.3}$$

Tendo em vista que:

$$\begin{aligned}\sum_{j=1}^{n}(y_i - a - bx_i) &= \sum_{j=1}^{n} y_i - \sum_{j=1}^{n} a - \sum_{j=1}^{n} bx_i \\ &= \sum_{j=1}^{n} y_i - an - b\sum_{j=1}^{n} x_i\end{aligned}$$

obtemos o seguinte sistema de equações, denominado "equações normais" do problema, cujas incógnitas são os parâmetros $a$ e $b$ da equação $y = a + bx$:

$$\left\{\begin{array}{rcrcl} na & + & \left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right) b & = & \sum_{i=1}^{n} y_i \\ \left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right) a & + & \left(\sum_{i=1}^{n} x_i^2\right) b & = & \sum_{i=1}^{n} x_i y_i \end{array}\right. \tag{2.4}$$

Exemplo 1:

Dada a tabela de pontos $(x_i, y_i)$ a seguir, determine pelo Método dos Mínimos Quadrados a equação da reta que melhor se ajusta a esses pontos.

| $x_i$ | -1.0 | -0.1 | 0.2 | 1.0 |
|---|---|---|---|---|
| $y_i$ | 1.000 | 1.099 | 0.808 | 1.000 |

Solução:

Como são $n = 4$ pontos, $\sum_{i=1}^{n} x_i = 0.1$, $\sum_{i=1}^{n} x_i^2 = 2.05$, $\sum_{i=1}^{n} y_i = 3.907$ e $\sum_{i=1}^{n} x_i y_i = 0.0517$, as equações normais do problema são, de acordo com 2.4:

$$\left\{\begin{array}{rcrcl} 4a & + & 0.10b & = & 3.9070 \\ 0.1a & + & 2.05b & = & 0.0517 \end{array}\right.$$

A solução deste sistema é $a = 0.9773$ e $b = -0.0224$. Assim, a reta que melhor se ajusta à tabela de pontos dada é:

$$y = 0.9773 - 0.0224x$$

# 3 Ajuste a uma exponencial

Mostremos, agora, como ajustar um conjunto de pontos $(x_i, y_i)$ a uma exponencial do tipo $y = \alpha e^{bx}$.

Esta função exponencial pode ser ajustada através da seguinte transformação:

$\ln y = \ln\left(\alpha e^{bx}\right) = \ln\alpha + bx$.

Fazendo $Y = \ln y$ e $a = \ln\alpha$, reduzimos o problema de ajustar a tabela de pontos $(x_i, y_i)$ referente a uma exponencial ao problema de ajustar a tabela de pontos $(x_i, Y_i)$,

onde $Y_i = \ln y_i$, à equação de uma reta $Y = a + bx$.

Exemplo 2:

Suponhamos que em um laboratório obtivemos experimentalmente os seguintes valores para $f(x_i)$ sobre os pontos $x_i$:

| $x_i$ | -1.0 | -0.7 | -0.4 | -0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $y_i$ | 36.547 | 17.264 | 8.155 | 3.852 | 1.820 | 0.860 | 0.406 | 0.246 |

Solução:

Fazendo o diagrama de dispersão dos dados acima, verifica-se que um ajuste do tipo $y = \alpha e^{bx}$ é o mais indicado. Efetuando-se as transformações $Y = \ln y_i$, obtemos a tabela $(x_i, \ln y_i)$ a seguir:

| $x_i$ | -1.0 | -0.7 | -0.4 | -0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $\ln y_i$ | 3.599 | 2.849 | 2.099 | 1.349 | 0.599 | -0.151 | -0.901 | -1.402 |

Como $n = 8$ pontos, $\sum_{i=1}^{n} x_i = 0.3$, $\sum_{i=1}^{n} x_i^2 = 3.59$, $\sum_{i=1}^{n} y_i = 0.041$ e $\sum_{i=1}^{n} x_i y_i = -8.646$, as equações normais do problema são, de acordo com 2.4:

$$\begin{cases} 8a & + & 0.30b & = & 0.041 \\ 0.30a & + & 3.59b & = & -8.646 \end{cases}$$

A solução deste sistema é $a = 1.099$ e $b = -2.5$. Como $a = \ln \alpha$ então $\alpha = e^a = e^{1.099} = 3.001$. Assim, a exponencial que melhor se ajusta à tabela de pontos dada é:

$$y = 3.001 e^{-2.5x}$$

# 4 Ajuste a uma hipérbole

Para ajustar uma tabela de pontos $(x_i, y_i)$, onde:

$$y = \frac{1}{\alpha_1 + \alpha_2 x} \tag{4.5}$$

basta fazer $z = \frac{1}{y} = \alpha_1 + \alpha_2 x$.

# 5 Ajuste a uma curva exponencial $y = \alpha_1 \alpha_2^x$

Para ajustar uma tabela de pontos $(x_i, y_i)$, onde:

$$y = \alpha_1 \alpha_2^x \tag{5.6}$$

basta fazer as seguintes transformações, considerando $y > 0$:

$z = \ln y = \underbrace{\ln \alpha_1}_{a} + x \underbrace{\ln \alpha_2}_{b} = a + bx$

## 6 Ajuste a uma curva geométrica $y = \alpha_1 x^{\alpha_2}$

Para ajustar uma tabela de pontos $(x_i, y_i)$, onde:

$$y = \alpha_1 x^{\alpha_2} \tag{6.7}$$

basta fazer as seguintes transformações, considerando $y > 0$ e $x > 0$:

$z = \ln y = \underbrace{\ln \alpha_1}_{a} + \underbrace{\alpha_2}_{b} \underbrace{\ln x}_{t} = a + bt$

Neste caso, estamos minimizando as somas dos quadrados dos desvios nos logaritmos de $y$, para os logaritmos dos desvios de $x$.

## 7 Ajuste a um polinômio

O objetivo, agora, é mostrar como ajustar os pontos de uma tabela com $n$ pontos a uma função polinomial de grau $m$:

$$P(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + b_m x^m \tag{7.8}$$

onde $m \leq n - 1$. Neste caso, a soma dos quadrados das distâncias de $y_i$ à $P(x_i)$ é dada por:

$$q = \sum (y_i - P(x_i))^2 \tag{7.9}$$

e depende de $m + 1$ parâmetros $a_0, a_1, \cdots, a_m$. Para minimizar essa função, temos que satisfazer às $m + 1$ condições a seguir:

$$\frac{\partial q}{\partial a_i} = 0 \ \ \forall i = 0, 1, \cdots, m \tag{7.10}$$

a qual fornece um sistema de $m + 1$ equações normais.

No caso de a função polinomial ser quadrática, isto é:

$$P(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 \tag{7.11}$$

as equações normais são:

$$\left\{ \begin{array}{rcrcrcl} n a_0 & + & \left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right) a_1 & + & \left(\sum_{i=1}^{n} x_i^2\right) a_2 & = & \sum_{i=1}^{n} y_i \\ \left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right) a_0 & + & \left(\sum_{i=1}^{n} x_i^2\right) a_1 & + & \left(\sum_{i=1}^{n} x_i^3\right) a_2 & = & \sum_{i=1}^{n} x_i y_i \\ \left(\sum_{i=1}^{n} x_i^2\right) a_0 & + & \left(\sum_{i=1}^{n} x_i^3\right) a_1 & + & \left(\sum_{i=1}^{n} x_i^4\right) a_2 & = & \sum_{i=1}^{n} x_i^2 y_i \end{array} \right. \tag{7.12}$$

Observe que este sistema é simétrico. Para resolvê-lo, isto é, para encontrar as incógnitas $a_0, a_1, \cdots, a_m$, podemos aplicar qualquer um dos métodos numéricos apresentados anteriormente.

# 8 Qualidade do ajuste

A qualidade de um ajuste linear pode ser verificada em função do coeficiente de determinação $r^2$, dado por:

$$r^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} (y_i - \bar{y})^2 - \sum_{i=1}^{n} (y_i - a - bx_i)^2}{\sum_{i=1}^{n} (y_i - \bar{y})^2} \tag{8.13}$$

sendo $\bar{y} = \frac{1}{n}\left(\sum_{i=1}^{n} y_i\right)$. Quanto mais próximo da unidade $r^2$ estiver, melhor é o ajuste.

Observe que o coeficiente de determinação é uma medida da proporção da variação total dos dados em torno da média. De fato, o numerador desta expressão representa a diferença entre a soma dos quadrados dos desvios de cada ponto ao ponto médio $\bar{y}$ deles e a soma dos quadrados dos desvios de cada ponto à reta que ajusta os pontos. Já o denominador representa a soma dos quadrados dos desvios de cada ponto ao ponto médio $\bar{y}$.

A expressão 8.13 pode ser simplificada para:

$$r^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^{n} (y_i - a - bx_i)^2}{\sum_{i=1}^{n} y_i^2 - \frac{1}{n}\left(\sum_{i=1}^{n} y_i\right)^2} \tag{8.14}$$